

# EFLEVAR®



## Calcio dobesilato 500 mg

### Comprimidos

Venta bajo receta - Industria Argentina

<b>Fórmula Cualicuantitativa</b>	Calcio Dobesilato.....500,00 mg.
Cada comprimido contiene:	Almidón pregelatinizado.....93,40 mg.
	Copolividona.....60,00 mg.
	Crospovidona.....16,40 mg.
	Croscarmelosa sódica.....8,20 mg.
	Celulosa microcristalina.....97,00 mg.
	Dióxido de Silicio Coloidal.....8,20 mg.
	Talco.....24,50 mg.
	Estearato de magnesio.....12,30 mg.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Regulador de los vasos capilares.

**ACCIÓN FARMACOLÓGICA:** EFLEVAR® actúa en las paredes capilares donde regula las funciones fisiológicas alteradas tales como la permeabilidad aumentada y resistencia disminuida. Se opone a la degradación del colágeno disminuyendo la hiperviscosidad sanguínea y plasmática mejorando el flujo sanguíneo y la irrigación tisular. EFLEVAR aumenta indirectamente el flujo linfático favoreciendo la disminución del edema intersticial.

**INDICACIONES CLÍNICAS:** EFLEVAR® está indicado en microangiopatías tales como la microangiopatía periférica diabética y retinopatía diabética, insuficiencia venosa crónica y sus manifestaciones clínicas (dolor, pesadez, edema), tromboflebitis superficial, síndrome post-trombótico, trastornos circulatorios arterio-venosos, síndrome hemorroidal y todos aquellos trastornos que dependen de la alteración de la microcirculación.

**FARMACOCINÉTICA:** La absorción intestinal de EFLEVAR® es casi completa alcanzando su máxima tasa plasmática a las 6 horas de administrado. La ligadura a las proteínas plasmáticas es del 20-25 %. La vida media plasmática es de 5 horas. Se metaboliza en el hígado y se elimina por vía urinaria y fecal en un 90% en forma intacta y un 10% como metabolitos conjugados. EFLEVAR® no atraviesa la barrera hemato-encefálica ni la placenta.

**POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:** Debe ajustarse a la indicación y a cada caso en particular. Las dosis habituales son: 1 a 3 comprimidos por día, durante las comidas. La duración del tratamiento es variable dependiendo de la afección a tratar y queda a criterio del médico.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad conocida al Dobesilato de Calcio. Primer trimestre de embarazo.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Si bien el pasaje de EFLEVAR® a la leche materna es mínimo, se desaconseja su empleo durante la lactancia.

En pacientes con insuficiencia hepática o renal severas, deben reducirse las dosis de EFLEVAR® a la mitad.

**ACCIONES COLATERALES:** En general EFLEVAR® es bien tolerado.

Ocasionalmente pueden presentarse trastornos gastrointestinales y rash cutáneo.

**SOBREDOSIFICACIÓN:** En caso de administrarse una sobredosis y presentarse signos clínicos de intoxicación se deberán seguir las reglas habituales para estos casos y concurrir o comunicarse con:

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666/2247.

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/4658-7777.

Optativamente, otros centros de intoxicaciones.

**ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS:** No se conocen hasta el presente.

**PRESENTACIONES:** Envases de 500 mg conteniendo blisters con 30 y 60 comprimidos recubiertos.

**CÓDIGO ATC:** C 05 B X01.

**CONSERVACIÓN:** Conservar a temperaturas entre 4° y 25° C, al abrigo de la luz.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Acción Social.

Certificado N°: 47.561.

 **OM Pharma**

Elaborado bajo licencia de

**OM PHARMA Meyrin - Ginebra, Suiza**

en: Galicia 2652 - Capital Federal



**GÉMINIS FARMACÉUTICA S.A.**

Laboratorio de Especialidades Medicinales

Avda. 2da Rivadavia 23.333 (B1714GJI) - Ituzaingó

Pcia. de Buenos Aires. Tel: (011) 2150-6625

Dirección Técnica: Liliana Vallés, Farmacéutica.