

# Rodinac® Gesic

Diclofenac Potásico 50 mg - Paracetamol 300 mg

# Rodinac® Gesic F

Diclofenac Potásico 50 mg - Paracetamol 500 mg

Comprimidos Recubiertos

Industria Argentina - Venta bajo receta



## Lea todo el prospecto detenidamente antes de tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

## Contenido del prospecto:

1. ¿Qué es y para qué se utiliza RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC?
2. Antes de usar RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC.
3. ¿Cómo utilizar RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC ?
4. Posibles eventos adversos.
5. Conservación de RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC.
6. Información adicional.

### 1. ¿Qué es y para qué se utiliza RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC?

RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC es una asociación que contiene dos principios activos, Paracetamol (analgésico) y Diclofenac Potásico (antiinflamatorio).

Está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas tales como artritis reumatoide, espondilo artritis (artritis de la columna vertebral), artrosis, reumatismo extracurricular, ataque agudo de gota, dismenorrea primaria (dolores menstruales), dolores post traumáticos e inflamación y dolor de procesos post operatorios, odontológicos y otorrinolaringológicos.

### 2. Antes de usar RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC.

No tome RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC si es alérgico al Paracetamol o al Diclofenac, aspirina u otros analgésico/antiinflamatorios; si padece úlcera u otras enfermedades graves del corazón, hígado o riñón, alcoholismo, hemorragias, alteraciones de la coagulación, tratamiento anticoagulante o diurético intensivo.

Antes de tomar RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC su médico necesita saber:

- Si está embarazada o en periodo de lactancia
- Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta.
- Si usted consume algún medicamento por enfermedad crónica
- Si usted consume tres o más vasos de bebida alcohólica

### Tenga en cuenta que:

El paracetamol y/o diclofenac pueden causar serias reacciones en la piel, pero estas son muy poco comunes. Usted debe suspender inmediatamente el tratamiento con RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC si presentara alguna reacción cutánea como urticaria, enrojecimiento de la piel, ronchas, ampollas y separación de la capa superior de la piel y debe realizar una consulta médica rápidamente. Además usted debe evitar la re-exposición al RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC si ha presentado reacciones cutáneas serias.

### 3. ¿Cómo utilizar RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC?

**Adultos y adolescentes mayores de 14 años de edad:** 1 comprimido cada 8 a 12 horas según las indicaciones del médico tratante.

**Niños y adolescentes menores de 14 años:** no se indica su uso debido a las concentraciones de ambos principios activos.

Como recomendación general, la dosis debe ajustarse individualmente y administrarse la mínima dosis eficaz durante el menor tiempo posible.

Los comprimidos deben tragarse enteros con líquido preferentemente antes de las comidas.

No deben dividirse ni masticarse.

### 4. Posibles efectos adversos.

Al igual que otros medicamentos RODINAC® GESIC F / RODINAC® GESIC puede provocar efectos adversos aunque no todas las personas lo sufran.

Pueden producirse efectos no deseados causados por el medicamento como: alteraciones gastrointestinales (nauseas, vómitos, diarreas, o constipación, dolor abdominal), mareos, erupciones en la piel, disminución del recuento de plaquetas en el análisis de sangre.

**Si considera que alguno de los eventos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en esta información informe a su médico o farmacéutico.**

## 5. Conservación de RODINAC ® GESIC F / RODINAC ® GESIC

Conservar en su envase original, a temperatura ambiente (preferentemente entre 15° y 30°C).

Caducidad: No utilice RODINAC ® GESIC F / RODINAC ® GESIC después de la fecha de vencimiento.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notifi-car.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

**ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:**

**HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ**

TELÉFONO (011) 4962-6666/2247

**HOSPITAL POSADAS**

TELÉFONO (011) 4654-6648/7777

**CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA DE LA PLATA**

TELÉFONO (0221) 451-5555

## 6. Información adicional

Composición de RODINAC ® GESIC F / RODINAC ® GESIC

Los principios activos son Paracetamol y Diclofenac Potásico.

Los demás componentes son: PVP K30, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, celulosa microcristalina pH 200, Hidroxipropilmetilcelulosa Cp 15, polietilenglicol 6000, óxido de hierro amarillo, dióxido de titanio y talco.

## PRESENTACIONES:

RODINAC ® GESIC: envases conteniendo 10, 20 y 30 comprimidos recubiertos.

RODINAC ® GESIC F: envases conteniendo 10, 20 y 30 comprimidos recubiertos.

## PRODUCTO LIBRE DE GLUTEN:



## MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 47.989

Fecha de Última Revisión: Septiembre del 2019



### GÉMINIS FARMACÉUTICA S.A.

Laboratorio de Especialidades Medicinales

2da Rivadavia 23.333. CP B1714GJI - Ituzaingó, Pcia. Bs. As.

Tel.: (011) 2150-6625

Dirección Técnica: Liliana Vallés, Farmacéutica

Elaborado en: Laboratorio Frasca SRL: Galicia 2652/64/66,  
CABA, CP 1416, Argentina