

# Mudantil® F

Fexofenadina Clorhidrato 60 mg



2 0 2 7 0

## COMPRIMIDOS

Industria Argentina - Venta Libre

### ANTIALÉRGICO, NO PRODUCE SEDACIÓN - ALIVIO MULTI-SÍNTOMAS

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

#### 1 / ¿QUÉ CONTIENE MUDANTIL® F?

**Principios activos:** Fexofenadina clorhidrato 60 mg

**Excipientes:** Celulosa microcristalina pH 101, PVP K30, croscarmelosa sódica, laurilsulfato de sodio, estearato de magnesio, rojo punzo 4R, talco, aerosil 200.

#### 2 / ACCIÓN/ES

Antihistamínico. Antialérgico.

#### 3 / ¿PARA QUÉ SE USA MUDANTIL® F?

Mudantil F® contiene fexofenadina clorhidrato, que es un antihistamínico de segunda generación, por lo que no produce sedación.

Mudantil F® se utiliza en adultos y adolescentes a partir de 16 años, para aliviar los síntomas asociados a Rinitis Alérgica. Los 5 síntomas más frecuentes de la rinitis alérgica son estornudos, picazón de ojos y/o nariz, secreción nasal, congestión nasal, enrojecimiento y lagrimeo de ojos.

Mudantil F® también se utiliza para la reducción del prurito (picazón), ronchas de la piel y sarpullidos.

#### 4 / ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR MUDANTIL® F?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes de la fórmula.

#### 5 / ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted tiene problemas en el hígado o en los riñones consulte a su médico antes de tomarlo. Si Ud. tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, podría aumentar el riesgo de palpitaciones (taquicardia).

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Efectos sobre la capacidad de conducir: Es improbable que Mudantil® F produzca un efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. En ensayos objetivos se ha demostrado que no ejerce efectos significativos sobre la función del sistema nervioso central. Esto significa que se puede conducir o realizar tareas que requieran concentración.

#### 6 / ¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Al igual que todos los medicamentos, Mudantil® F puede producir efectos adversos.

Consulte con su médico inmediatamente y deje de tomar Mudantil® F si nota que:

- Se le hincha la cara, los labios, la lengua o la garganta y tiene dificultad para respirar, porque pueden ser síntomas de una reacción alérgica.

#### Efectos adversos frecuentes:

- Dolor de cabeza
- Somnolencia
- Sensación de malestar (náuseas)
- Mareos.

#### Efectos adversos poco frecuentes:

- Cansancio

#### Otros efectos adversos que pueden ocurrir son:

- Dificultad para dormir (insomnio)

- Trastornos del sueño
- Pesadillas
- Nerviosismo
- Latido del corazón rápido o irregular
- Diarrea
- Erupción en la piel y picor
- Urticaria
- Reacciones alérgicas graves que pueden producir inflamación de la cara, labios, lengua o garganta, sofoco, opresión en el pecho, y dificultad para respirar.

Si usted toma al mismo tiempo medicamentos para la indigestión que contienen aluminio y magnesio, estos pueden afectar la acción de **Mudantil® F** disminuyendo la cantidad de medicamento absorbido. **Se recomienda dejar un intervalo de unas 2 horas entre la toma de Mudantil® F y la del remedio para la indigestión.**

**SI LOS SÍNTOMAS DE RINITIS PERSISTEN POR MAS DE 7 DÍAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MEDICO.**

#### **7 / ¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

Adultos y niños a partir de 16 años. La dosis recomendada es 1 comprimido (60 mg) dos veces al día.

Ingeridos con agua, antes de las comidas.

**No se ha determinado su uso para menores de 16 años.**

#### **8 / SI OLVIDÓ TOMAR MUDANTIL®F**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Tome la siguiente dosis a la hora habitual indicada por su médico.

#### **9 / SI INTERRUMPE EL TRATAMIENTO CON MUDANTIL®F**

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **10 / MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Conservar a temperatura ambiente entre 5 y 25°C.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **11 / PRESENTACIÓN**

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

#### **12 / ¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 / 2247

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777

HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767

*Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> ó llamar a ANMAT responde 0800-333-1234*

**MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTA A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.**

Especialidad médica autorizada por el ministerio de salud. Certificado N° 48099.

Dirección Técnica: Dr. Liliana Vallés – Farmacéutica

Fecha de última revisión: Julio 2023

Elaborado en: Le Corbusier 2881, Malvinas Argentina, Pcia. De Bs. As. / Galicia 2652/64/66, CABA

Géminis Farmacéutica S.A. - 2da Rivadavia 23.333 – CP B1714GJ – Ituzaingó. Pcia. Bs. As. - Tel.: 2150-6625

Versión 3